


ALMACENAMIENTO CORRECTO DE VACUNAS




Geles refrigerantes

Vacunas liofilizadas (virus vivo)
Newcastle + Bronquitis

Vacunas liofilizadas (virus vivo)
Bursine - 2

Vacunas inactivadas



PROHIBIDO




¡NUNCA COLOQUE VACUNAS EN EL CONGELADOR!
¡NUNCA COLOQUE VACUNAS EN LA PUERTA!

- 1 Almacenar las vacunas a una temperatura de 2 °C a 7°C
- 2 Colocar los lotes de vencimiento más próximos en la parte delantera para su pronto uso.
- 3 Las vacunas inactivas deben ser aplicadas al ave a una temperatura de 37 °C. Recuerda que los geles refrigerantes sirven para mantener la temperatura baja, para llevarlos con la vacuna viva liofilizada en caja térmica al campo
- 4 y también en casos de desperfectos o falta de energía.

EMBALAJE CORRECTO DE VACUNAS

VISTA SUPERIOR



Caja térmica

Geles refrigerantes

Vacunas

Cartones o tecknopor como protector aislante

- 1 Congelar el **gel refrigerante** por 48 horas como mínimo a -18 °C.
- 2 Colocar las **vacunas** en el centro de una **caja térmica**.
- 3 Agregar los **geles refrigerantes** al rededor y encima de las **vacunas**.
- 4 Finalmente sitúa los **protectores** entre los geles y las **vacunas**.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN MARTINKULLU

VACUNACIÓN PARA LA ENFERMEDAD DE MAREK

Administrar la vacuna a pollitos sanos de 01 día de edad con una inyección de 0.2 ml por ave, a través de la vía sub cutánea.

PERIODO DE VACUNACIÓN PARA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

TIPO DE EXPLOTACIÓN	1º Semana de vida		Levante (2-20 semanas)		Producción (21-74 semanas)		Muda (Mayor a 60 semanas)	
	Vacuna viva	Vacuna inactivada (oleosa)	Vacuna viva	Vacuna inactivada (oleosa)	Vacuna viva	Vacuna inactivada (oleosa)	Vacuna viva	Vacuna inactivada (oleosa)
Pollos de engorde	1	1	1(*)					
Ponedoras y reproductoras	1	1	2	1				
Aves de pelea	1		1	1	1		1	1
Crianza de traspatio**	1		1	1	1	Una por año	1	
Pavos de engorde	1		2(*)			Una por año		
Pavos reproductores	1		2		2			
VÍA DE ADMINISTRACIÓN	Administre una dosis (01 gota) por ave a través de la vía óculo-nasal, asperción o en el agua de bebida.							

A TENER EN CUENTA

La Región de Ayacucho cuenta con una **topografía accidentada**. Se encuentra a 2300 m.s.n.m.

La temperatura media anual máxima es de **23.8 °C** y la mínima de **9.3 °C**.

El **clima es seco** y la temporada de lluvia es de **noviembre a abril**.

- 📍 AV. 26 DE ENERO, NRO. 658, AYACUCHO
- ☎ RPM: #965957070
- ✉ VENTAS@MARTINKULLU.PE
- 🌐 WWW.MARTINKULLU.PE
- 📘 /MARTINKULLU.PE



MARTINKULLU
VETERINARIA

Vacunas de calidad garantizada

**PROGRAMA DE
VACUNACIÓN,
ALMACENAMIENTO,
Y EMBALAJE DE
VACUNAS PARA
AVES**